

SINOSI

Setting	Indicazioni
Reflusso Gastroesofageo con Sintomi Tipici (Pirosi, Rigurgito)	PPI per 8 settimane
Malattia da Reflusso Gastroesofageo Non Erosiva	PPI per 8 settimane
Esofagite da Reflusso Grado A o B secondo la Classificazione di Los Angeles	PPI per 8 settimane
Esofagite da Reflusso Grado C o D secondo la Classificazione di Los Angeles	PPI a dosi doppie per 8 settimane
Reflusso Gastroesofageo con Sintomi Atipici	Dosi doppie di PPI per 1-3 mesi. Se persistono i sintomi associare terapie aggiuntive
Dispepsia	Ricerca e trattare l'infezione da <i>H. pylori</i> . PPI per 4-8 settimane nei pazienti non infetti o in quelli che non migliorano dopo l'eradicazione soprattutto nei pazienti con prevalente dolore epigastrico (<i>Epigastric Pain Syndrome</i> secondo i criteri di Roma III).
Terapia con FANS	PPI a lungo termine (Nota 1 AIFA) solo nei soggetti a rischio di complicanze (ovvero pazienti che presentano ≥ 1 fra i seguenti fattori di rischio: età >65 anni; storia di malattia peptica, uso concomitante di steroidi e/o anticoagulanti). Prima di iniziare terapia a lungo termine è indicata la ricerca e l'eradicazione dell'infezione da <i>H. pylori</i> .
Terapia con Antiaggreganti	PPI a lungo termine (Nota 1 AIFA) solo nei soggetti a rischio di complicanze (ovvero pazienti che presentano ≥ 1 fra i seguenti fattori di rischio: età >65 anni; storia di malattia peptica, uso concomitante di steroidi e/o anticoagulanti)
Terapia con Steroidi	Non è indicata terapia con IPP tranne che nei pazienti che assumono contemporaneamente FANS
Terapia con Anticoagulanti Orali	Non è necessaria terapia con IPP tranne che nei pazienti che assumono FANS e/o antiaggreganti. Il pantoprazolo ed il rabeprazolo rappresentano gli IPP di scelta.
Pazienti con Cirrosi Epatica	Il trattamento con IPP per la prevenzione del sanguinamento da varici non è consigliato.
Politerapia	Nei casi in cui una terapia con IPP si impone, pantoprazolo e rabeprazolo sono le molecole da preferire

Se non altrimenti specificato, le dosi degli IPP alle quali si fa riferimento sono sempre dosi standard, somministrate una volta al giorno (prima di colazione).