

SINOSSI

Titolo	La Sindrome dell'intestino irritabile, negli ambulatori AIGO. Aspetti clinici, gestionali e impatto sulla qualità di vita
Razionale	<p>La sindrome dell'intestino irritabile (IBS) rappresenta una condizione clinica caratterizzata da una elevata prevalenza nella popolazione mondiale e in particolare in quella italiana. Un corretto inquadramento clinico non può prescindere da una adeguata conoscenza della storia del paziente e dei criteri di Roma III che permettono di formulare una diagnosi positiva di IBS.</p> <p>I dati della letteratura sottolineano come ancora oggi sia presente un'ampia inappropriata prescrivibilità, sia in ambito diagnostico con l'impiego di esami invasivi come la colonscopia o potenzialmente pericolosi come l'impiego di un imaging radiologico ad alta esposizione di radiazioni ionizzanti o di visite specialistiche che portano a loro volta ad una ridondanza degli esami. Inoltre anche l'aspetto terapeutico non viene spesso guidato da trial clinici che purtroppo in questo ambito non sono sempre di grande qualità.</p> <p>Questa survey della Associazione Italiana dei Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO), vuole essere uno strumento per valutare l'impatto della patologia sulla popolazione generale, anche in termini di qualità di vita, e ha l'obiettivo di migliorare l'inquadramento diagnostico e l'appropriatezza terapeutica nella gestione di questi pazienti.</p> <p>La survey prevede la compilazione in modo anonimo di un breve questionario da parte del paziente e dal gastroenterologo del centro AIGO.</p> <p>I dati verranno inseriti in modo informatizzato e saranno compilabili direttamente sul sito AIGO con un tempo medio di stesura della durata di pochi minuti.</p>
Tipologia dello studio	Studio Prospettico Multicentrico Osservazionale non interventista (Survey)



Obiettivo primario	Valutare l'impatto dell'IBS, negli ambulatori di gastroenterologia italiani
Obiettivi secondari	Valutare l'impatto dell'IBS sulla qualità di vita dei pazienti. Valutare l'inquadramento diagnostico e l'appropriatezza nella gestione di questi pazienti negli ambulatori di gastroenterologia italiani.
Criteri di inclusione	pazienti di età >18 anni con diagnosi di IBS basata sui criteri ROMA III
Criteri di esclusione	Nessuno
Numero pazienti	1.500-2.000
Durata dello studio	6 mesi
Esito misurato	scala HADS, SF12, score di Francis; SCALA DI BRISTOL
Nr centri partecipanti	80
Responsabile Scientifico	Dr Marco Soncini
Board scientifico per conto di AIGO	Dr Massimo Bellini Dr Gioacchino Leandro Dr Paolo Usai Satta Dr Giuseppe Milazzo Dr Marco Soncini