



SIMG

SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA GENERALE
E DELLE CURE PRIMARIE

IPERTRANSAMINASEMIA SENZA SINTOMI

MMG /CDC SPOKE

Anamnesi per Alcol, Farmaci, Abitudini di vita

(ECOGRAFIA EPATICA o POCUS in ambulatorio del MMG)

A: sospetto danno da **farmaci** senza fattori di rischio per epatite acuta fulminante: sospendere farmaco, eventuale consulto con medico prescrittore, follow-up biochimico (

B: sospetto danno da **alcol**: teleconsulto con gastroenterologo x eventuale presa in carico

C: sospetta **epatite acuta** (transaminasi > 10 volte i livelli normali) - esclusione alcol/farmaci: eseguire (preferibilmente in CdC) HAV-IgM, HCV-Ab, HBsAg**, ANA, Immunoglobuline, HBV-DNA e ricerca HDV nel carrier inattivo di HBV, sierodiagnosi x virus epatitici minori se tutto negativo.

D: Ipertransaminasemia con sospetta **colestasi**, associata ad aumento fosfatasi alcalina e/o GGT: eseguire AMA, ANA, immunoglobuline (IgG, IgM)

E: Ipertransaminasemia in soggetto con **sindrome metabolica**: eseguire (Colesterolo, Col-HDL, Trigliceridi, Insulinemia, HBc-Ab, sideremia, transferrina, ferritina, ANA, calcolo FIB-4

F: per **altre condizioni** non comprese eseguire sideremia, transferrina, Ab anti-transglutaminasi, o consulto/teleconsulto con gastroenterologo

** se non vaccinato



HUB (Casa della Comunità)

1. esami indicati nel pannello superiore
2. Ecografia fegato e vie biliari
3. Fibroscan o ARFI
4. Visita gastroenterologica o teleconsulto con

IPERTRANSAMINASEMIA + SINTOMI

Sintomi
colica biliare

Sintomi
febbre, ittero

Sintomi
astenia, prurito, dimagrimento

DEU/ Ospedale della Comunità

1. Trattamento farmacologico di urgenza
2. Esecuzione di prelievo ematico per routine + Fosfatasi Alcalina, Amilasi, Lipasi
3. Ecografia fegato e vie biliari
4. Visita gastroenterologica

DEU/Ospedale della Comunità

(in base a entità dei sintomi e condizioni generali)

1. Eventuale trattamento farmacologico di urgenza
2. Esecuzione di prelievo ematico per routine, ALP, Amilasi, Lipasi, HAV-IgM, HVC-Ab, HBsAg*, HBsAb*, HBcAb*, ANA, SMA
3. Ecografia fegato e vie biliari
4. Visita gastroenterologica/chirurgica o teleconsulto con gastroenterologo

*= se non vaccinato

Casa della Comunità

1. Anamnesi per Alcol, Farmaci
2. Esecuzione di prelievo ematico per routine, HVC-Ab, HBsAg*, HBsAb*, HBcAb*, ANA, AMA, AML, sideremia, transferrina, anticorpi anti- trans glutamasi
3. Ecografia fegato e vie biliari
4. Visita gastroenterologica o teleconsulto con gastroenterologo *= se non vaccinato